

癌化学療法輸液約束処方 慢性リンパ性白血病

癌種 慢性リンパ性白血病

レジメン名 CLL2 Alemtuzumab

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	投与時間	1クール期間
マブキャンパス	アレムツズマブ	ALZ	3mg→10mg→30mg	div	導入期：連日 維持期：隔日	2時間	

- ① NS 50ml + ポララミン 1A + ソルコーテフ 200mg / 15分 ☆別々のシリンジで混注
- ② NS 50ml + グラニセトロン 1A / 15分
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 100ml + マブキャンパス mg / 2時間 ☆フィルター使用
- ⑤ NS 50ml / 5分

< 備考 >

導入期：連日投与 Grade3以上のインフュージョンリアクションが認められない場合 3mg→10mg または10mg→30mgへ増量

維持期：隔日投与 30mg/body

カロナール600mg内服

休薬規定：好中球数<250または血小板数<2.5万 血小板<2.5万で開始した場合はベースラインから50%以上の減少

減量規定：（好中球≧500および血小板数≧5万で再開、または好中球<2.5万で開始の場合ベースライン値に回復したら再開）

初回発現時：休薬時の用量で再開、2回目発現時：10mgまたは休薬時の用量の低い方の用量で再開 7日以上休薬時：3mgから再開

投与制限：12週間まで

R5.3.24作成