

癌化学療法輸液約束処方 骨髄異形成症候群

癌種 骨髄異形成症候群
レジメン名 MDS1：AZA点滴静注

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
ビダーザ	アザシチジン	AZA	75mg/m ²	DIV	DAY 1,2,3,4,5,6,7	3週間	4週間

【DAY 1,2,3,4,5,6,7】

- ①生食 50ml + アロキシ 0.75 mg / 15分 (DAY 1のみ)
- ②生食 50ml + ビダーザ 75mg/m² / 10分
- ③生食 50ml / 全開

【備考】

- 1) ビダーザは1Vを蒸留水10mlで溶解し、生食に混注する。
- 2) 原則、混合調整後、1時間以内に投与を終了すること。
- 3) 5%ブドウ糖液、ヘタスターチ、重炭酸塩含有溶液とは混合不可。
- 4) Rp①のアロキシはDAY 1のみ投与。DAY 2～7は生食でラインキープ。
- 5) 休日、祭日はスキップし、翌日投与。
- 6) **投与時間要確認**

癌種 骨髄異形成症候群
レジメン名 MDS1：AZA皮下注

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
ビダーザ	アザシチジン	AZA	75mg/m ²	SC	DAY 1,2,3,4,5,6,7	3週間	4週間

【DAY 1,2,3,4,5,6,7】

- ①蒸留水(溶解液) + ビダーザ 75mg/m² / 皮下注

【備考】

- 1) ビダーザは1Vあたり蒸留水4mlを加え激しく振り混ぜて懸濁する。
- 2) 原則、混合調整後、30分以内に投与を終了すること。
- 3) 混注後速やかに投与が出来ない場合は、冷所(2～8℃)で8時間保存可能。
取り出した後は30分以内に投与を終了すること。
- 4) 休日、祭日はスキップし、翌日投与。
- 5) **投与時間要確認**

