

癌化学療法輸液約束処方 共通レジメン

癌種 非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫、腎細胞癌、ホジキンリンパ腫、頭頸部癌、胃癌、MSI-High大腸癌
 尿路上皮癌の術後化学療法、原発不明癌、食道癌（進行再発または術後補助化学療法）

レジメン名

共通NIVO

周術期投与期間要注意

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
オプジーボ	ニボルマブ	NIVO	240 mg/body	div	30分	DAY 1	14日
			480 mg/body	div	30分	DAY 1	28日

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + オプジーボ 240 または 480 mg / 30分（インラインフィルター使用）
- ③ NS 50ml / 5分

【注意事項】

- ・術後補助化学療法は12ヶ月間まで
- ・希釈後の最終濃度を0.35mg/ml 以上とし、30分以上かけて点滴静注。
- ・投与の際にはインラインフィルター(0.2又は0.22µm)を使用すること。
- ・投与開始前及び投与中にTSH、FT3、FT4などを定期的に測定。
- ・有害事象に対し副腎皮質ステロイドを投与する際に、HBVの再活性化に注意。
- ・パワーポート、BARD Xポート(シリコンカテーテル)使用不可

<休薬規定>

呼33参照

R4.5.15改訂