

癌化学療法輸液約束処方 急性リンパ芽球性白血病

癌種 急性リンパ性白血病
 レジメン名 ALL5 Blinatumoma 45 k g 以上

【1コース目：寛解導入療法】

薬品名 (商品名)	一般名	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
ビーリンサイト	ブリナツモマブ	9 μ g	div	Day1-7	42日間
		28 μ g		Day8-28	

【2～5コース目：寛解導入～地固め療法】

薬品名 (商品名)	一般名	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
ビーリンサイト	ブリナツモマブ	28 μ g	div	Day1-28	42日間

【6～9コース目：維持療法】

薬品名 (商品名)	一般名	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
ビーリンサイト	ブリナツモマブ	28 μ g	div	Day1-28	84日間

① NS 50 ml + デキサート 2.5A / 30分 ②とは別ラインで投与 1コース目はDay1,8 2コース目以降はDay1

② NS 270 ml + ビーリンサイト mg / 24時間 ☆フィルター使用

【備考】

- ①ラインフラッシュ不可
- ②デキサートと同一ラインでの投与不可
- ③フィルター使用
- ④24時間で交換、残破棄

【調製時】

- ①生食 250 ml に生食 20 ml を添加→輸液安定剤 (5.5 ml) を添加し静かに転倒混和
- ②1Vあたり注射用水3mlにて溶解→それぞれ9 μ g : 0.83ml 28 μ g : 2.6ml を採取

R5.4.21作成