

癌化学療法輸液約束処方 骨軟1

癌種 骨軟部肉腫
レジメン名 骨軟1 ADM + CDDP

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
ドキシソルピシン	ドキシソルピシン	DXR	30 mg/m ²	div	DAY 1-2	-	4週
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	100 mg/m ²	div	DAY 1	-	4週

< 化学療法前日 >

- div
① ソルラクト500 ml / 朝
② ソルデム3A 500 ml / 朝
③ ソルデム3A 500 ml / 夕
④ ソルデム3A 500 ml / 夕

< DAY 1 >

- div
0:00 ① ソルデム3A 500 ml / 240分
4:00 ② ソルデム3A 500 ml / 120分
6:00 ③ ソルデム3A 500 ml / 90分
7:30 ④ ソルデム3A 500 ml / 90分
9:00 ⑤ ソルデム3A 500 ml
+ メトクロプラミド 2A
+ ポララミン 1A
+ ソル・メルコート 125 mg / 90分
10:30 ⑥ アザセトロン注 1A IV
10:30 ⑦ Ns 500 ml + シスプラチン mg / 300分
10:30 ⑧ 側管) マンニトール 300 ml / 30分
15:30 ⑨ ソルデム3A 500 ml + フロセミド 20 mg 0.5A / 90分
17:00 ⑩ Ns 50 ml + ドキシソルピシン mg / 30分
17:30 ⑪ ソルデム3A 500 ml + コントミン 25 mg 2/5A / 90分
19:00 ⑫ ソルデム3A 500 ml + アタラックスP 25 mg 2A / 90分
20:30 ⑬ ソルデム3A 500 ml + フロセミド 20 mg 0.5A / 90分
22:00 ⑭ ソルラクト 500 ml + コントミン 25 mg 2/5A / 2hr

< DAY 2 >

- div
0:00 ① ソルデム3A 500 ml / 180分
3:00 ② ソルデム3A 500 ml / 180分
6:00 ③ ソルデム3A 500 ml + フロセミド 20 mg 0.5A / 180分
9:00 ④ ソルデム3A 500 ml + メトクロプラミド 2A / 180分
12:00 ⑤ ソルデム3A 500 ml + ソル・メルコート 40 mg / 150分
14:30 ⑥ Ns 50 ml + ドキシソルピシン mg / 30分
15:00 ⑦ ソルデム3A 500 ml + アタラックスP 25 mg 2A / 180分
18:00 ⑧ ソルデム3A 500 ml / 180分
21:00 ⑨ ソルラクト 500 ml / 180分

< DAY 3 >

- div
0:00 ① ソルデム3A 500 ml / 240分
4:00 ② ソルデム3A 500 ml / 240分
8:00 ③ ソルデム3A 500 ml / 240分
12:00 ④ ソルデム3A 500 ml / 240分
16:00 ⑤ ソルデム3A 500 ml / 240分
20:00 ⑥ ソルデム3A 500 ml / 240分

< DAY 4 >

- div
0:00 ① ソルデム3A 500 ml / 300分
5:00 ② ソルデム3A 500 ml / 300分
10:00 ③ ソルデム3A 500 ml / 300分
15:00 ④ ソルデム3A 500 ml / 300分
20:00 ⑤ ソルデム3A 500 ml / 240分

< DAY 5-6 >

- div ① ソルデム3A 500 ml / 朝
② ソルデム3A 500 ml / 朝
③ ソルデム3A 500 ml / 夕