

癌化学療法輸液約束処方 骨軟 4

癌種 骨軟部肉腫（切除不能進行・再発、術前術後補助化学療法、入院）
レジメン名 骨軟4 MAID

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
イホマイド	イホスファミド	IFO	2500 mg/m ²	div	72時間	DAY 1-3	21日間
ウロミテキサン	メスナ	-	2500 mg/m ²	div		DAY 1-4	
ダカルバジン	ダカルバジン	DTIC	225 mg/m ²	div	60分	DAY 1-3	
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	DXR	20 mg/m ²	div	10分	DAY 1-3	
放射線	-	術前	22 Gy/course x2	-	-	-	-
		術後	16 Gy				

[DAY 1]

- 6:00-10:00 ① Ns 1000ml / 240分
 9:30-10:00 ② Ns 100ml + デキサート8mg 2A + アロキシ 0.75mg 1A / 30分
 10:00-10:00 ③ Ns 1000ml + イホマイド mg + ウロミテキサン mg / 24時間
 10:00-10:10 ④ 側) Ns 50ml + ドキシソルビシン mg / 10分
 10:10-11:10 ⑤ 5%Tz 250ml + ダカルバジン mg / 60分
 11:10-13:10 ⑥ ソルデム3A 500ml + ネオファーゲン 40ml / 120分
 13:10- ⑦ ソルデム3A 1000ml + 7%メイロン 20ml 2A / 翌日側管までキープ

[DAY 2, 3]

- 9:30-10:00 ① Ns 100ml + デキサート 8mg 2V / 30分
 10:00-10:00 ② Ns 1000ml + イホマイド mg + ウロミテキサン mg / 24時間
 10:00-10:10 ③ 側) Ns 50ml + ドキシソルビシン mg / 10分
 10:10-11:10 ④ 5%Tz 250ml + ダカルバジン mg / 60分
 11:10-13:10 ⑤ ソルデム3A 500ml + ネオファーゲン 20ml 2A / 120分
 13:10- ⑥ ソルデム3A 1000ml + 7%メイロン 40ml / 翌日側管までキープ

[DAY 4]

- 10:00-10:00 ① Ns 1000ml + ウロミテキサン mg + 7%メイロン 20ml 2A / 24時間
 10:00-12:00 ② 側) ソルデム3A 500ml / 120分
 12:00-14:00 ③ 側) ソルデム3A 500ml / 120分

[備考]

悪心嘔吐対策

- Rp.1 イメドカプセル 125mg 分1 8:30 Day.1
 イメドカプセル 80mg 分1 8:30 Day.2-3
 Rp.2 プリンペラン 30mg 分3 毎食後 7日分
 Rp.3 ドンペリドン 30mg 分3 毎食後 7日分
 Rp.4 デカドロン 8mg 分2 朝食後 2日分 Day.4-5

注意事項

- ① 左記処方では効果不十分の場合、ノバミン(5) 3T 分3 毎食後で内服(セロトニン受容体拮抗薬は使用しない)。
 ② 内服不可時はセレネース5mg + 生理食塩水100ml / 30分を点滴静注する。
 ③ 十分な水分を摂取するが尿量(50ml/hr以下)の場合、Drコールする。
 ④ **ダカルバジンを投与中は輸液バックおよび点滴ラインを遮光する(血管痛対策)。**
 ⑤ 壊死性抗がん剤のため刺入部を確認する(血管外漏出対策)。