

癌化学療法輸液約束処方 肛2

癌種 肛門癌

レジメン名 肛2 FP+RT

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	1000 mg/m ²	div	24時間	DAY 1-4, 29-32	42日間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	75 mg/m ²	div	120分	DAY 1, 29	

【 DAY 1, 29 】

CV

- ① NS 1000 ml + マグネゾール1A + KCl 1キット / 120分
- ② NS 100 ml + デキサート 1.5V + アロキシ 1V / 30分
イメンド125mg内服
- ③ NS 300 ml + シスプラチン mg / 120分
- ④ NS 500 ml + フルオロウラシル mg / 24時間

側管 div ④と同時

- ① NS 500ml / 60分
- ② マンニトール 300 ml / 60分

【 備考 】

- ・総コース制限: 1-2コース
- ・DAY1,29イメンド125mg、DAY2~,DAY30~⇒80mg
- ・必要に応じて補液追加

【 休薬基準 】

Grade3以上の血液毒性または非血液毒性

【 減量基準 】

Grade4の好中球減少、発熱性好中球減少症または非血液毒性

【 DAY 2,3,4,30,31,32 】

CV

- ① NS 500 ml + フルオロウラシル mg / 24時間
- ② NS 50 ml / 5分 (Day 4, Day 32のみ)

側管

10:00~ NS 100 ml + デキサート1V / 30分
イメンド80mg内服

R4.12.1作成