

## 癌化学療法輸液約束処方 食7

癌種 食道癌  
レジメン名 食7 DOC + 5FU + high dose CDGP

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投薬日	1コースの期間
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	700 mg/m <sup>2</sup>	120 時間	civ	DAY 1-5	21日間
アクブラ	ネダプラチン	CDGP	70 mg/m <sup>2</sup>	60分	div	DAY 1	
ドセタキセル	ドセタキセル	DOC	60 mg/m <sup>2</sup>	180分	div	DAY 1	

### 【 DAY 1 】 \*フィルター使用

< CV >

① NS 50ml / 5分点滴静注 ラインキープ用

10:00-10:00 ② テルモ生食 1000 ml + フルオロウラシル(5FU)           mg + メトクロプラミド 2A + アスパラカリウム 2キット / 24時間  
イメンドカプセル125mg内服

11:00-11:15 < 側管 >

11:15-11:30 ① NS 100 ml + アロキシ 1V / 15分

11:30-12:30 ② NS 100 ml + デキサート 1.5V / 15分

12:30-15:30 ③ NS 250 ml + アクブラ           mg / 60分

15:30-18:30 ④ ヴィーンF 500 ml + メトクロプラミド 2A / 180分

18:30 ⑤ NS 500 ml + ドセタキセル           mg / 180分 ☆フィルター使用

⑥ NS 100ml / 10分

### 【 DAY 2-5 】

10:00-10:00 < CV >

① テルモ生食 1000 ml + フルオロウラシル(5FU)           mg + メトクロプラミド 2A + アスパラカリウム 2キット / 24時間

11:00-11:15 < 側管 >

11:15 ② NS 100 ml + デキサート 1V / 15分

③ NS 100 ml / 10分

④ NS 100 ml / 10分 (DAY 5のみCV①終了後)

### 【 備考 】

① イメンドカプセルはイメンド125mg、DAY2～⇒80mg服用