

## 癌化学療法輸液約束処方 食10

癌種 食道癌

レジメン名 食10 FP+RT

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	700 mg/m <sup>2</sup>	div	24時間	DAY 1-4, 29-32	42日間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	70 mg/m <sup>2</sup>	div	120分	DAY 1, 29	
放射線	-	RT		-	-	5日/週, 1日1回2Gy 計60Gy	

【 DAY 1, 29 】

CV

- ① NS 1000 ml + マグネゾール1A + KCl 1キット / 120分
- ② NS 100 ml + デキサート 1.5V / 10分
- ③ NS 100 ml + アロカリス 1V + アロキシ 1V / 30分
- ④ NS 300 ml + シスプラチン mg / 120分
- ⑤ NS 500 ml + フルオロウラシル mg / 24時間

側管 div ⑤と同時

- ① NS 500ml / 60分
- ② マンニトール 300 ml / 60分

【 備考 】

- ・シスプラチンの神経障害(聴覚障害など)に注意 総投与量: 500-600mg/m<sup>2</sup>
- ・必要に応じて補液追加

【 投与基準 】

Cre ≤ 1.2 BUN ≤ 25mg/dl Ccr ≥ 60ml/min T-bili ≤ 1.2mg/dl AST, ALT ≤ ULN × 2

WBC ≥ 4000 好中球 ≥ 1500 Hb ≥ 10 Plt ≥ 10 × 10<sup>4</sup>/m<sup>3</sup>

【 DAY 2,3,4,30,31,32 】

CV

- ① NS 500 ml + フルオロウラシル mg / 24時間
- ② NS 50 ml / 5分 (Day 4, Day 32のみ)

側管

10:00~ NS 100 ml + デキサート1V / 30分

R1.8.23 改訂  
R4.12.10改訂