

## 癌化学療法輸液約束処方 食13

癌種                    食道癌  
レジメン名 食13 FP(末梢)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	800 mg/m <sup>2</sup>	div	24時間	DAY 1-5	21日間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	80 mg/m <sup>2</sup>	div	120分	DAY 1	

### 【 DAY 1 】

- ① NS 1000 ml + マグネゾール1A + KCl 1キット / 120分
- ② NS 100 ml + デキサート 1.5V / 10分
- ③ NS 100 ml + アロカリス 1V + アロキシ 1V / 30分
- ④ NS 300 ml + シスプラチン            mg / 120分
- ⑤ NS 500 ml + フルオロウラシル            mg / 24時間

### 側管 div ⑤と同時

- ① NS 500ml / 60分
- ② マンニトール 300 ml / 60分

### 【 備考 】

- ・シスプラチンの神経障害(聴覚障害など)に注意 総投与量: 500-600mg/m<sup>2</sup>
- ・静脈炎に注意
- ・必要に応じて補液追加

### 【 投与基準 】

Cre ≤ 1.2 BUN ≤ 25mg/dl Ccr ≥ 60ml/min T-bli ≤ 1.2mg/dl AST,ALT ≤ ULN × 2  
WBC ≥ 4000 好中球 ≥ 1500 Hb ≥ 10 Plt ≥ 10 × 10<sup>4</sup>/m<sup>3</sup>

### 【 DAY 2,3,4,5 】

- ① NS 500 ml + フルオロウラシル            mg / 24時間
- ② NS 50 ml / 5分 (Day 5のみ)

### 側管

10:00~ NS 100 ml + デキサート1V / 30分

R1.8.23 改訂  
R4.12.10 改訂