

癌化学療法輸液約束処方 食16

癌種 食道癌
 レジメン名 食16 NIVO+FP(2週間)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間
オプジーボ	ニボルマブ	NIVO	240 mg/ body	div	30分	DAY 1,15	28日間
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	800 mg/m ²	div	24時間	DAY 1-5	
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	80 mg/m ²	div	120分	DAY 1	

【 DAY 1 】

- ① NS 100ml / 10分
- ② NS 100ml + オプジーボ 240 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 1000 ml + マグネズール1A + KCl 1キット / 120分
- ⑤ NS 100 ml + デキサート 1.5V / 10分
- ⑥ NS 100 ml + アロカリス 1V + アロキシ 1V / 30分
- ⑦ NS 300 ml + シスプラチン mg / 120分
- ⑧ NS 500 ml + フルオロウラシル mg / 24時間

側管 div ⑧と同時

- ① NS 500ml / 60分
- ② マンニトール 300 ml / 60分

【 備考 】

- ・静脈炎に注意
- ・必要に応じて補液追加

【 投与基準 】

休薬 好中球<1500 PLT<10万 AST,ALT>99 T-bli>1.5 Ccr<31
 減量 31<Ccr<45で50%、46<Ccr<60で75%

【 DAY 2,3,4,5 】

- ① NS 500 ml + フルオロウラシル mg / 24時間
- ② NS 50 ml / 5分 (Day 5のみ)

側管

10:00~ NS 100 ml + デキサート1V / 30分

【 DAY 15 】

- ① NS 100ml / 10分
- ② NS 100ml + オプジーボ 240 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分

【 NIVO投与基準 】

共通NIVO参照

R4.6.29作成
 R4.12.10 改訂