

## 癌化学療法約束処方 子体1

癌種 子宮体癌  
登録No. 子体1 PTX triw + CBDCA

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	175~180 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1	20日	21日
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5~6	div	DAY 1	20日	21日

div

- ① NS 100 ml + ファモチジン 20mg + デキサート3V / 10分
- ② NS 50 ml + アロキシ0.75mg / 30分
- ③ NS 500 ml + パクリタキセル \_\_\_\_\_ mg / 3hr  
投与速度: 投与開始後15分間 90ml/hr 以降 180ml/hr
- ④ 5%Tz 100 ml + ネオファーゲンC 1A + タチオン 1A / 10分
- ⑤ NS 250 ml + カルボプラチン \_\_\_\_\_ mg / 1hr
- ⑥ NS 50 ml + 8.4%メイロン 20 ml / 15分
- ⑦ NS 50 ml / 5分

TOTAL 5hr25min

【注意】 ・上記①の際 レスタミン(10)5Tab 予薬  
・フィルター使用

【備考】 ・パクリタキセル滴下時、vital sign測定を頻回に

【パクリタキセル過敏症対策】

- ①投与速度 投与開始から15分は90ml/hrにて投与し、バイタル測定して問題なければ180ml/hrにアップする。  
速度変更15分後に再度バイタル測定し、患者の状態に変化がなければ終了まで同速で投与を行う。  
H27.6.15 女性診療科医局会にて決定

R1.9.7 改訂