

## 癌化学療法約束処方 子体3

癌種 子宮体癌  
登録No. 子体3 CAP

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	50~75 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1	2~3週	3~4週
エピルビシン	エピルビシン	EPI	50 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1	2~3週	3~4週
テラルビシン	ピラルビシン	THP	30 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1	2~3週	3~4週
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	500 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1	2~3週	3~4週

### < CAP前日 >

21:00-24:00 ① ラクテック 500 ml

### < CAP療法当日 >

- 0:00-5:00 ① ビカネイト 1000 ml  
 5:00-7:00 ② ソルデム3A 500 ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシン 2g  
 7:00-8:30 ③ マンニトール 300 ml  
 8:30-10:00 ④ ソリューゲンF 500 ml + ソル・メルコート 125mg  
 10:00-10:30 ⑤ NS 50 ml + アロキシ 1A イメンドカプセル125mg服用  
 10:30-12:30 ⑥ NS 350 ml + シスプラチン mg  
 12:30 側 NS 50 ml + エピルビシン or ピラルビシン mg ☆エピルビシンは原液投与  
 12:30 側 NS 50 ml + エンドキサン mg  
 12:30-14:30 ⑦ NS 500 ml + 8.4%メイロン 20 ml + プリンペラン 1A  
 14:30-17:00 ⑧ ヴィーンD 500 ml + ネオファーゲンC 20 ml + タチオン 200mg  
 17:00-19:30 ⑨ ソルデム3A 500 ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシン 2g  
 19:30-22:00 ⑩ NS 500 ml + 8.4%メイロン 20 ml + メトクロプラミド 1A  
 ⑪ ヘパリンNaロック用 1本

### < CAP療法 2-4日目 >

- ① ソルラクト 500 ml / 2.5hr  
 ② NS 50 ml + デキサート1V / 5分  
 ③ ソルデム3A 500 ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシン 2g / 2.5hr  
 ④ ヴィーンD 500 ml + ネオファーゲンC 20 ml + タチオン 200mg / 2.5hr  
 ⑤ ソルデム3A 500 ml + 8.4%メイロン 20 ml + メトクロプラミド 1A / 2.5hr  
 ⑥ ヴィーンD 500 ml + ホスホマイシン 2g / 2.5hr  
 ⑦ ヘパリンNaロック用 1本

2日目 ①~⑦投与 ②開始時 イメンドカプセル80mg 服用

3日目 ③~⑦投与 ③開始時 イメンドカプセル80mg 服用

4日目 ③, ⑤, ⑥, ⑦投与後終了抜針で

H26.10.31 改訂