

## 癌化学療法約束処方 子体4

癌種 子宮体癌  
登録No. 子体4 AP

周術期投与期間要注意

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	50 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1	2~3週	3~4週
エピルビシン	エピルビシン	EPI	50 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1	2~3週	3~4週
テラルビシン	ピラルビシン	THP	30 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1	2~3週	3~4週
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	DXR	60 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1	2~3週	3~4週

### < AP前日 >

21:00-24:00 ① ソルラクト 500 ml

### < AP療法当日 >

- 0:00-5:00 ① ビカネイト 1000 ml
- 5:00-7:00 ② ソルデム3A 500 ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシン 2g
- 7:00-8:30 ③ マンニトール 300 ml
- 8:30-10:00 ④ ソリューゲンF 500 ml + ソル・メルコート 125mg
- 10:00-10:30 ⑤ NS 100 ml + アロキシ 1A+ アロカリス 1A
- 10:30-12:30 ⑥ NS 350 ml + シスプラチン mg
- 12:30 側 NS 50 ml + ドキシソルビシン mg ☆注意
- 12:30-14:30 ⑦ NS 500 ml + 8.4%メイロン 20 ml + メトクロプラミド 1A
- 14:30-17:00 ⑧ ヴィーンD 500 ml + ネオファーゲンC 20 ml + タチオン 200mg
- 17:00-19:30 ⑨ ソルデム3A 500 ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシン 2g
- 19:30-22:00 ⑩ NS 500 ml + 8.4%メイロン 20 ml + メトクロプラミド 1A
- ⑪ ヘパリンNaロック用 1本 ☆注意: エピルビシンは原液投与

### < AP療法 2-4日目 >

- ① ソルラクト 500 ml / 2.5hr
- ② 生食 100 ml + デキサート1V + メトクロプラミド 1A / 30分
- ③ ソルデム3A 500 ml + ファモチジン 1A + ホスホマイシン 2g / 2.5hr
- ④ ヴィーンD 500 ml + ネオファーゲンC 20 ml + タチオン 200mg / 2.5hr
- ⑤ ソルデム3A 500 ml + 8.4%メイロン 20 ml + メトクロプラミド 1A / 2.5hr
- ⑥ ヴィーンD 500 ml + ホスホマイシン 2g / 2.5hr
- ⑦ ヘパリンNaロック用 1本

- 2日目 ①~⑥, ⑦投与
- 3日目 ②~⑥, ⑦投与
- 4日目 ③, ⑤, ⑥投与後終了抜針で

H26.10.31 改訂  
H27.10.1 改訂  
R2.12.改訂  
R5.3.15.改訂