

癌化学療法約束処方 子体8

癌種 子宮体癌(肉腫)
登録No. 子体8 GEM + DOC

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	1コースの期間
ゲムシタビン	塩酸ゲムシタビン	GEM	800~1000 mg/m ²	30分	末梢	DAY 1, 15	28日
ドセタキセル	ドセタキセル	DOC	30~40mg/m ²	1 hr	末梢	DAY 1, 15	

< DAY 1, 15 > フィルター使用

- ① NS 100 ml + デキサート1V / 5分
- ② NS 100 ml + グラニセトロン1A / 5分
- ③ NS 100 ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ④ 5%TZ 250 ml + ドセタキセル mg / 1hr
- ⑤ NS 50 ml / 5分

Total 2 hr

< 備考 >

- ① Grade 3/4の血液毒性および非血液毒性、酸素飽和度95%未満は休薬する。
- ② 休薬後、14日以上回復期間を要した場合は次回投与よりゲムシタビン800mg/m²に減量する。
- ③ 副作用として血管炎、血管痛、間質性肺炎、骨髄抑制等に注意する。
- ④ ①②の投与時間は主治医判断により変更可

R1.9.7 改訂