

## 癌化学療法約束処方 子宮体癌11

癌種 子宮体癌(癌肉腫)  
登録No. 子体11 TI(PTX+IFM)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	135 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1	-	3週間
イホマイド	イホスファミド	IFM	1.6 g/m <sup>2</sup>	div	DAY 1-3	-	
ウロミテキサン	ウロミテキサン		300 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1-3	-	

### 【 DAY 1 】

- ① NS 50ml + デキサート 2V + ファモチジン 20mg / 5分  
点滴開始時 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 内服
- ② NS 50ml + アロキシ 0.75mg / 30分
- ③ 5%Tz 500ml + パクリタキセル \_\_\_\_\_ mg / 3時間 ☆フィルター使用  
投与速度: 投与開始後15分間 90ml/hr 以降 180ml/hr
- ④ NS 50ml + ウロミテキサン \_\_\_\_\_ mg / 30分
- ⑤ NS 500ml + イホマイド \_\_\_\_\_ mg / 2時間
- ⑥ NS 500ml + 8.4%メイロン 20ml / 2時間
- ⑦ ビカネイト 500ml + 8.4%メイロン 20ml / 2時間
- ⑧ NS 50ml + ウロミテキサン \_\_\_\_\_ mg / 30分
- ⑨ NS 500ml + 8.4%メイロン 20ml / 2時間
- ⑩ ビカネイト 500ml + 8.4%メイロン 20ml / 2時間
- ⑪ NS 50ml + ウロミテキサン \_\_\_\_\_ mg / 30分
- ⑫ NS 50ml / 5分

### 【 DAY 2,3 】

- ① NS 50ml + デキサート 1V / 5分
- ② NS 50ml + ウロミテキサン \_\_\_\_\_ mg / 30分
- ③ NS 500ml + イホマイド \_\_\_\_\_ mg / 2時間
- ④ NS 500ml + 8.4%メイロン 20ml / 2時間
- ⑤ ビカネイト 500ml + 8.4%メイロン 20ml / 2時間
- ⑥ NS 50ml + ウロミテキサン \_\_\_\_\_ mg / 30分
- ⑦ NS 500ml + 8.4%メイロン 20ml / 2時間
- ⑧ ビカネイト 500ml + 8.4%メイロン 20ml / 2時間
- ⑨ NS 50ml + ウロミテキサン \_\_\_\_\_ mg / 30分
- ⑩ NS 50ml / 5分

### 備考

#### 減量規定

治療前に放射線療法 時イホスファミド 1.2g/m<sup>2</sup>とする  
Grade2以上の神経毒性出現時、イホスファミド 0.4g/m<sup>2</sup>まで漸減  
血液毒性出現時、パクリタキセル 100mg/m<sup>2</sup>へ減量  
ウロミテキサンの1回量はイホスファミド1.2g/m<sup>2</sup>→240mg/m<sup>2</sup>  
0.8g/m<sup>2</sup>→160mg/m<sup>2</sup>  
0.4g/m<sup>2</sup>→80mg/m<sup>2</sup>

H30.2.28 作成  
H30.3.5 改訂