

## 癌化学療法輸液約束処方 膵5

癌種 膵臓癌 再発・切除不能（入院・外来）

レジメン名 膵5 FOLFONI

| 薬品名（商品名） | 一般名             | 略号      | 標準投与量                      | 投与時間 | 投与経路  | 投与日    | 投与期間                  |
|----------|-----------------|---------|----------------------------|------|-------|--------|-----------------------|
| オニバイド    | ナノリポソーマル イリノテカン | nal-IRI | 70mg/m <sup>2</sup>        | 90分  | CVポート | DAY1   | 2週間<br>(4週間で1<br>コース) |
| レボホリナート  | レボホリナートCa       | l-LV    | 200mg/m <sup>2</sup>       | 2時間  | CVポート | DAY1   |                       |
| フルオロウラシル | フルオロウラシル        | 5-FU    | 1600~2400mg/m <sup>2</sup> | 46時間 | CVポート | DAY1~3 |                       |

### 【CVポート】

- ① NS 50ml + デキサート1V / 5分
- ② NS 50ml + アロキシ 1V + アロカリス 1V / 30分
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 500ml + オニバイド \_\_\_\_\_ mg / 90分 ☆ フィルターなし
- ⑤ NS 50ml / 5分
- ⑥ 5%TZ 250ml + レボホリナート \_\_\_\_\_ mg / 2時間
- ⑦ フルオロウラシル \_\_\_\_\_ mg

NS \_\_\_\_\_ ml 計 \_\_\_\_\_ ml / 46hr } ニプロ シュアーフューザー使用

終了時 NS 20ml でフラッシュ

SFS-1002D (100ml用)  
SFS-5-25 (250ml用)

減量基準: Grade2 ≤ 有害事象 休薬基準: Grade3 ≤ 骨髄抑制、下痢

減量: nal-IRI: 70 → 50 → 43mg/m<sup>2</sup> → 中止

5FU: 2400 → 1800 → 1350mg/m<sup>2</sup> → 中止

R4.12.19改訂