

癌化学療法輸液約束処方 絨毛8

癌種 絨毛性疾患セカンドライン化学療法
 登録No. 絨8 EA 療法

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	休薬期間	1クール期間
ベプシド	エトポシド	VP-16	100mg/body	1 hr	DAY 1-4	10~17日	14~21日
コスメゲン	アクチノマイシンD	ACM-D	0.5 mg/body	静注	DAY 1-4		

[DAY 1] *PVCフリーライン、フィルターなし

- ① NS 50ml + アロキシ 1V + ファモチジン 1V + デキサート 1V / 5分
イメンドカプセル125mg内服
- ② NS 500ml + エトポシド 100mg / 1時間
- ③ 注射用水 2ml + コスメゲン 0.5mg / 静脈内注射(医師施行)
- ④ ソルラクト 500ml + メトクロプラミド 10mg / 2時間
- ⑤ ソルラクト 500ml + ネオファーゲン 20 ml / 2時間

[DAY 2~4] *PVCフリーライン、フィルターなし

- ① NS 50ml + ファモチジン 1V + デキサート 1V / 5分
イメンドカプセル80mg内服(DAY2,3のみ)
- ② NS 500ml + エトポシド 100mg / 1時間
- ③ 注射用水 2ml + コスメゲン 0.5mg / 静脈内注射(医師施行)
- ④ ソルラクト 500ml + メトクロプラミド 10mg / 2時間
- ⑤ ソルラクト 500ml + ネオファーゲン 20 ml / 2時間

H26.10.31 改訂