

癌化学療法輸液約束処方 腎5

癌種

腎癌

レジメン名

腎5 PEMBRO+AXT

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	PEMBRO	200mg/body	div	30分	DAY 1	21日
インライタ	アキシチニブ	AXT	10 mg/body (4~20 mg/body)	p.o.	朝夕食後	連日	

[DAY 1]

- ① NS 100ml / 15分
- ② NS 100ml + キイトルーダ 200 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 100ml / 10分 フラッシュ

【注意事項】

- ・インライタの調節は3週間毎
- ・希釈後の最終濃度を1~10mg/mlとする。
- ・投与の際にはインラインフィルターを使用すること。
- ・投与開始前及び投与中にTSH、FT3、FT4などを定期的に測定。
- ・有害事象に対し副腎皮質ステロイドを投与する際に、HBVの再活性化に注意。

<休薬規定>

PEMBRO: AST,ALT ≥ Grade3、自己免疫性疾患の発症

AXT: Grade4以上の血液毒性、非血液毒性

<減量規定>

PEMBRO: なし

AXT: Grade4以上の血液毒性、Grade3以上の非血液毒性

2024.2.3 改訂

2020.10.26 改訂

