

癌化学療法輸液約束処方 脳7

癌種 germinoma、medulloblastomaなどの悪性脳腫瘍

レジメン名 脳7 ICE療法

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投薬期間	1クール期間
エトポシド	エトポシド	VP-16	60 mg/m ²	div	2時間	DAY1-5	4週
ウロミテキサン	メスナ		270 mg/m ² × 3	div	30分		
イホマイド	イホスファミド	IFM	900 mg/m ²	div	2時間		
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	20 mg/m ²	div	2時間		

[DAY 1-5]

6:00-9:30	① ヴィーンD 500ml / 3.5時間	【備考】
9:30-10:00	② NS 100ml + グラニセトロン 3mg + デキサート 4mg / 30分	① 通常6コース 最大8コース(聴力モニタリング)
10:00-12:00	③ 5%TZ 500ml + <u>エトポシド</u> _____ mg / 2時間 ☆フィルターなし	② 減量・中止基準:別紙参照
12:00-14:00	④ NS 500ml + <u>イホマイド</u> _____ mg / 2時間 ファシール使用	③ Rp⑪のウロミテキサンの投与タイミングは Rp⑧の開始時間からの起算を優先
	Rp⑤を同時投与	
12:00-12:30	【側管】 ⑤ NS 100ml + <u>ウロミテキサン</u> _____ mg / 30分	
	側管よりRp④と同時投与	
14:00-14:30	⑥ NS 100ml + グラニセトロン 3mg + デキサート 4mg / 30分	
14:30-16:30	⑦ NS 500ml + <u>シスプラチン</u> _____ mg / 2時間	
16:30-17:00	⑧ NS 100ml + <u>ウロミテキサン</u> _____ mg / 30分	
17:00-18:30	⑨ 20%マンニトール 300ml / 1.5時間	
18:30-翌日6:00	⑩ ソルデム3A 500ml + ヴィーンD 500ml / 11.5時間	
20:30-21:00	【側管】 ⑪ NS 100ml + <u>ウロミテキサン</u> _____ mg / 30分	
	Rp⑩の側管より投与(Rp⑧開始から4時間後に投与)	