

# 癌化学療法輸液約束処方 非ホジキンリンパ腫

癌種 CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫  
 レジメン名 NHL6 R-HDMTX/AraC (Hyper-CVAD/MA療法後半)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	投与時間	1クール期間
リツキサン	リツキシマブ	R	375mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 5	下記参照	21日間
メトレキセート	メトレキサート	MTX	1000 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1	24時間	
キロサイド	シタラビン	AraC	3000 mg/m <sup>2</sup> × 2	div	DAY 2, 3	3時間(1日2回12時間毎)	
レボホリナート	レボホリナートCa	l-LV	7.5 mg/body	iv	DAY 2-5	22時、4時、10時、16時(6時間毎)	

R-HDMTX/AraC

## メイン【DAY 1】メイン

- 10:00～ ①ソルデム1 500ml + 7%メイロン 20ml / 6時間  
 ②ソルデム1 500ml + 7%メイロン 20ml / 6時間  
 ③ビカネイト 1000ml + 7%メイロン 40ml / 12時間

【DAY 2】メイン: DAY1から連続 (側管よりレボホリナート投与あり: 下記参照)

- ①ビカネイト 1000ml + 7%メイロン 40ml / 12時間  
 ②ソルデム1 500ml + 7%メイロン 20ml / 6時間  
 ③ NS 50ml / フラッシュ

10:00～ 【DAY 3.4】メイン (側管よりレボホリナート投与あり: 下記参照)

- ① NS 1000ml + 7%メイロン 40ml / 12時間  
 ② NS 50ml / フラッシュ

【DAY 5】メイン (側管よりレボホリナート投与あり: 下記参照)

- 10:00～ ① NS 50ml + ポララミン 1A + ソルコーテフ 100mg / 15分  
 ② NS 500ml + リツキサン mg / 100ml/hrから開始  
 ③ NS 50ml / フラッシュ全開  
 ④ ソルデム3A 500ml / 2時間

< リツキサン調整方法・投与方法 >

- ・CD20陽性の場合投与
- ・1mg/mlとなるように生理食塩水(5%Tzも可)で希釈する。(10倍希釈)
- ・輸液バックは緩やかに混和する。振とうにより泡立つと抗体凝集がおきる。
- ・100ml/hrから開始し、30分毎に100mlずつアップする。最高400ml/hrまで上げる。

< 備考 >

- ・キロサイド投与時はステロイド点眼を併用すること(投与前日から4日間)
- ・MTX投与開始後24時、48時に血中濃度測定。1μM、0.1μMを超えたらロイコボリンレスキュー追加する。
- ・オプションでイメンドカプセル併用
- ・ロイコボリンはMTX投与36時間後から投与開始する。(DAY2の22時～DAY5の16時まで)
- ・尿量3000ml/日以上となるようHydoration。
- ・キロサイトは年齢、臓器機能により減量可
- ・必要に応じG-CSFを使用
- ・ダイアモックス250mg 4T分2 MTX投与前日から6日間

## 側管【DAY 1】側管

- 10:00～ ① 5%Tz 50ml + アロキシ 0.75mg + デキサート 16mg / 15分  
 イメンドカプセル125mg内服(オプション)  
 ② NS 500ml + メトレキセート mg / 24時間

【DAY 2】側管: DAY1につなげて (側管よりレボホリナート投与あり: 下記参照)

- ① NS 50ml + デキサート 8mg + メトクロプラミド1A / 15分  
 イメンドカプセル80mg内服(オプション)

- 10:30 ② 5%Tz 500ml + キロサイド mg / 3時間(12時間毎)  
 ③ NS 50ml / 全開  
 22:30 ④ 5%Tz 500ml + キロサイド mg / 3時間(12時間毎)  
 ⑤ NS 50ml / 全開

【DAY 3】側管 (側管よりレボホリナート投与あり: 下記参照)

- 10:00～ ① NS 50ml + デキサート 8mg + メトクロプラミド1A / 15分  
 イメンドカプセル80mg内服(オプション)  
 10:30 ② 5%Tz 500ml + キロサイド mg / 3時間(12時間毎)  
 ③ NS 50ml / フラッシュ全開  
 22:30 ④ 5%Tz 500ml + キロサイド mg / 3時間(12時間毎)  
 ⑤ NS 50ml / フラッシュ全開

【DAY 2, 3, 4, 5】側管(DAY2の22時～DAY5の16時まで)

A) レボホリナート7.5mg /iv (22時、4時、10時、16時)

H27.3.24作成  
 H28.7.1改訂  
 H30.10.4改訂  
 H30.12.21改訂  
 R5.5.25 改訂  
 R5.10.4 改訂

