

癌化学療法輸液約束処方 非ホジキンリンパ腫

癌種 CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫(再発・難治)

レジメン名 NHL10 GCD(内服困難)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	投与時間	1クール期間
デキサート	デキサメサゾン	DEX	40 mg	div	DAY1-4	30分	21日間
ゲムシタビン	ゲムシタビン	GEM	1000 mg/m ²	div	DAY1, 8	30分	
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC=5	div	DAY1	1時間	
リツキサン	リツキシマブ	R	375mg/m ²	div	DAY 8	下記参照	

【DAY 1】

- ① NS 50 ml + アロキシ 0.75 mg / 全開
- ② NS 50 ml + デキサート 40 mg / 30分
- ② NS 100 ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ③ 5%TZ 250 ml + カルボプラチン mg / 1時間
- ④ NS 50 ml / 全開

【DAY 2-4】

- ① NS 50 ml + デキサート 40 mg / 30分
- ② NS 50 ml / 全開

【DAY 8】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A + ソルコーテフ 100mg
- ② NS 100 ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ③ NS 50 ml / 全開

H29.11.21 作成