

癌化学療法輸液約束処方 非ホジキンリンパ腫

癌種 悪性リンパ腫
レジメン名 NHL16 DA-EPOCH-R

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	投与時間	1クール期間
リツキシマブ	リツキシマブ	R	375mg/m ²	div	DAY1	下記参照	21日間
エトポシド	エトポシド	ETP	50mg/m ²	div	DAY1-4	24時間	
ドキシソルビシン	塩酸ドキシソルビシン	ADR	10mg/m ²	div	DAY1-4	24時間	
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	0.4mg/m ²	div	DAY1-4	24時間	
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	750mg/m ²	div	DAY5	3時間	
プレドニン	プレドニゾロン	PSL	120mg/m ²	po	DAY1-5	分2	

【DAY 1】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A + ソルコーテフ 100mg / 全開 ☆別々のシリンジで混注 ※カロナール600mg内服
- ② NS 500ml + リツキシマブ mg /100ml/hrから開始
投与速度: 30分毎に 100ml ずつ上げる(200ml/hr → 300ml/hr → 400ml/hr)
- ③ NS 50ml + グラニセトロン 1A / 15分
- ④ NS 500ml + ドキシソルビシン mg + エトポシド mg + オンコビン mg / 24時間 フィルターなし

【DAY 2-4】

- ① NS 50ml + グラニセトロン 1A / 15分
- ② NS 500ml + ドキシソルビシン mg + エトポシド mg + オンコビン mg / 24時間 フィルターなし

【DAY 5】

- ① NS 50ml + グラニセトロン 1A / 15分
- ② NS 250ml + エンドキサン mg / 3時間 ☆ファシール使用
- ③ NS 50ml / 全開

< 投与量調整 >

ETP、ADR、CPA

各コースごと好中球の最低値が500/ μ L以上ならば20%増量する。

各コースごと、1または2ポイント好中球が500/ μ L未満だった場合、前クールと同量で投与。

各コースごと、3ポイント以上好中球が500/ μ L未満、または1ポイント血小板が2.5万未満だった場合、20%減量する。

VCR

運動性神経障害: Grade2→25%減量 Grade3→50%減量

感覚性神経障害: Grade3→50%減量