

## 癌化学療法輸液約束処方 非ホジキンリンパ腫

癌種 再発または難治性DLBCL  
レジメン名 NHL16 Pola-RB

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	投与時間	1クール期間
ポライビー	ポラツズマブ	Pola	1.8mg/kg	div	DAY1 (初回のみDAY2)	30分 (初回90分)	21日間
リツキシマブ	リツキシマブ	R	375mg/m <sup>2</sup>	div	DAY1	下記参照	
トレアキシシ	ベンダムスチン	B	90 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY1、2 (初回のみDAY2、3)	10分	

### Pola-RB 初回【DAY 1】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A + ソルコーテフ 100mg / 15分 ☆別々のシリンジで混注
- ② NS 500ml + リツキシマブ mg / 50ml/hrから開始  
投与速度:30分毎に 50ml ずつ上げる(100ml/hr → 150ml/hr → … → 400ml/hr)
- ③ NS 50ml / 5分

### Pola-RB 初回【DAY 2】

- ① NS 50ml + グラニセトロン1A / 15分
- ② NS 50ml + トレアキシシ mg / 10分
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 50ml + ポララミン 1A + ソルコーテフ 100mg / 15分 ☆別々のシリンジで混注
- ⑤ NS 50ml / 5分
- ⑥ NS 100ml + ポライビー mg / 90分 ☆フィルター使用  
(注射用蒸留水20ml: ポライビー溶解用)
- ⑦ NS 50ml / 5分

### Pola-RB 初回【DAY 3】、2クール目以降【DAY 2】

- ① NS 50ml + グラニセトロン1A / 15分
- ② NS 50ml + トレアキシシ mg / 10分
- ③ NS 50ml / 5分

### Pola-RB 2クール目以降【DAY 1】

- ① NS 50ml + グラニセトロン1A / 15分
- ② NS 50ml + トレアキシシ mg / 10分
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 50ml + ポララミン 1A + ソルコーテフ 100mg / 15分  
☆別々のシリンジで混注
- ⑤ NS 500ml + リツキシマブ mg / 100ml/hrから開始  
投与速度:30分毎に 100ml ずつ上げる  
(200ml/hr → 300ml/hr → 400ml/hr)
- ⑥ NS 50ml / 5分
- ⑦ NS 100ml + ポライビー mg / 30分 ☆フィルター使用  
(注射用蒸留水20ml: ポライビー溶解用)
- ⑧ NS 50ml / 5分

### < 備考 >

- ・6クールまで、リツキシマブとポライビー投与日はアセトアミノフェン併用
- ・ポライビーは蒸留水で溶解させ、投与時はフィルター使用
- ・RBの注意事項に関してはNHL3参照

休薬:末梢神経障害Gr2 好中球減少症または血小板減少Gr3 減量:血液毒性Gr4(B 90mg/m<sup>2</sup>→75mg/m<sup>2</sup>→50mg/m<sup>2</sup>→中止)

R4.3.19改訂

R5.11.13改訂