

## 癌化学療法輸液約束処方 非ホジキンリンパ腫

癌種 悪性リンパ腫  
非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫

レジメン名 NHL17 R-BAC

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	投与時間	1クール期間
リツキサシ	リツキシマブ	R	375mg/m <sup>2</sup>	div	DAY1	下記参照	28日間
トリアキシシ	ベンダムスチシ	B	70 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY2、3	10分	
キロサイド	シタラビシ	AraC	500~800mg/m <sup>2</sup>	div	DAY2-4	2時間	

### R-BAC 【DAY 1】

① NS 50ml + ポララミン 1A + ソルコーテフ 100mg / 15分

☆別々のシリンジで混注

② NS 500ml + リツキサシ mg / (初回)50ml/hrから開始 (2回目以降)100ml/hrから開始

投与速度: (初回) 30分毎に 50ml ずつ上げる (2回目以降) 30分毎に 100ml ずつ上げる(どちらも400ml/hrまで)

③ NS 50ml / 5分

### R-BAC 【DAY 2、3】

① NS 50ml + グラニセトロン1A / 15分

② NS 50ml + トリアキシシ mg / 10分

③ NS 250ml / 120分

④ NS 500ml + キロサイド mg / 120分

⑤ NS 50ml / 5分

### R-BAC 【DAY 4】

③ NS 250ml / 120分

④ NS 500ml + キロサイド mg / 120分

⑤ NS 50ml / 5分

### < 備考 >

- ・6クールまで
- ・休薬 Gr3以上の血液毒性、減量 Gr3以上の血液毒性 (ベンダムスチシおよびシタラビシを25%減量)
- ・RBの注意事項に関してはNHL3参照

### < オプション >

- ・フルオロメトロン点眼液1日4回(シタラビシによる結膜炎対策)
- ・アロプリノール100-300mg/日 (少なくとも初回の2週間)

その他腫瘍崩壊症候群に対応した輸液など

R4.5.20作成