

癌化学療法輸液約束処方 非ホジキンリンパ腫

癌種 未治療DLBCL
レジメン名 NHL18 Pola-R-CHP

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	投与時間	1クール期間
ポライビー	ポラツズマブ	Pola	1.8mg/kg	div	DAY1 (初回のみDAY3)	30分 (初回90分)	21日間
リツキシマブ	リツキシマブ	R	375mg/m ²	div	DAY1	下記参照	
エンドキサン	シクロフォスファミド	C	750 mg/m ²	div	DAY1 (初回のみDAY2)	90分	
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	H	50 mg/m ²	div	DAY1 (初回のみDAY2)	90分	
プレドニン	プレドニゾロン	P	100 mg/body	po	DAY1-5		

Pola-R-CHP 初回【DAY 1】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A + ソルコーテフ 100mg / 15分
☆別々のシリンジで混注、アセトアミノフェン内服
- ② NS 500ml + リツキシマブ mg / 50ml/hrから開始
投与速度:30分毎に 50ml ずつ上げる
(100ml/hr → 150ml/hr → … → 400ml/hr)
- ③ NS 50ml / 5分

Pola-R-CHP 初回【DAY2】

- ① NS 50ml + グラニセトロン1A / 15分
- ② NS 250ml + エンドキサン mg / 90分
- ③ NS 50ml + ドキシソルビシン mg / 15分
- ④ NS 50ml / 5分

Pola-R-CHP 初回【DAY 3】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A + ソルコーテフ 100mg / 15分
☆別々のシリンジで混注
- ② NS 50ml / 5分
- ③ NS 100ml + ポライビー mg / 90分 ☆フィルター使用
(注射用蒸留水20ml: ポライビー溶解用)
- ④ NS 50ml / 5分

Pola-R-CHP 2クール目以降【DAY 1】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A + ソルコーテフ 100mg / 15分
☆別々のシリンジで混注、アセトアミノフェン内服
- ② NS 500ml + リツキシマブ mg / 100ml/hrから開始
投与速度:30分毎に 100ml ずつ上げる
(200ml/hr → 300ml/hr → 400ml/hr)
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 100ml + ポライビー mg / 30分 ☆フィルター使用
(注射用蒸留水20ml: ポライビー溶解用)
- ⑤ NS 50ml / 5分
- ⑥ NS 50ml + グラニセトロン1A / 15分
- ⑦ NS 250ml + エンドキサン mg / 90分
- ⑧ NS 50ml + ドキシソルビシン mg / 15分
- ⑨ NS 50ml / 5分

＜備考＞ ・6クールまで、リツキシマブとポライビー投与日はアセトアミノフェン併用
・ポライビーは蒸留水で溶解させ、投与時はフィルター使用

休薬:Gr2以上の末梢神経障害 Gr3以上の血液毒性、非血液毒性

減量:Gr3以上の血液毒性(CまたはH 100%→75%→50%)、末梢神経障害(Pola 1.8mg→1.4mg→1.0mg)

R4.9.1改訂