## 癌化学療法輸液約束処方 乳15

癌種 乳癌

登録No. 乳15 Bev+PTX

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投薬期間	休薬期間	1クール期間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	80mg/m²	div	1hr	DAY1,8,15	1週	
アバスチン	ベバシズマブ	BV	10mg/kg	div	1回目:90分 2回目:60分 3回目以降:30分	DAY1, 15	biweekly	28日

## **[DAY 1,15]**

- NS50ml+デキサート1V / 5分
- ② NS50ml+ファモチジン1V+ポララミン1A / 5分
- ③ NS50ml+グラニセトロン1A / 5分
- ④ 5%TZ250ml+<u>パクリタキセル mg</u> /60分
- ⑤ NS50ml /5分
- ⑥ NS100ml + <u>アバスチン mg</u> /90分

(初回90分、2回目60分、3回目以降30分)

⑦ NS50ml / 5分

## [DAY 8 ]

- NS50ml+デキサート1V / 5分
- ② NS50ml+ファモチジン1A+ポララミン1A / 5分
- ③ NS50ml+グラニセトロン1A / 5分
- ④ 5%TZ250ml+パクリタキセル mg /60分
- ⑤ NS50ml /5分

## 【注意事項】

- ① 0.22ミクロン以下のインラインフィルターを使用する。
- ② アバスチンは主治医判断で2回目は60分、3回目以降は30分で投与可。

