

癌化学療法輸液約束処方 乳20

癌種 乳癌
登録No. 乳20 T-DM1

周術期投与期間要注意

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
カドサイラ	トラスツズマブ エムタンシン	T-DM1	3.6mg/kg	末梢またはCIV	DAY1	20日	21日間

div 1

1コース目

- ① NS50ml+デキサート 1V / 5分 カロナール併用
- ② NS250ml+ カドサイラ _____ mg / 90分 *フィルター使用
- ③ NS50ml / 5分

<備考> ①施行前カロナール併用が望ましい(初回のみ)

div 1

2コース目以降

- ① NS50ml / 5分
- ① NS250ml+ カドサイラ _____ mg / 30分 *フィルター使用
- ② NS50ml / 5分

【備考】①0.2または0.22 μ mのインラインフィルターを使用する。

②投与時間は、初回投与は90分、以後インフージョンリアクション等がなければ30分に短縮できる。

③制吐剤はオプションで使用可。

【特記事項】本レジメンは、HER2陽性の手術不能または再発乳がん患者で、トラスツズマブおよびタキサン系抗悪性腫瘍薬による化学療法の治療歴がある患者に使用する。
術後補助化学療法としては14クール目まで

R3.2.28改訂