

癌化学療法輸液約束処方 乳23

癌種 乳癌
登録No. 乳23 HP+Eribulin

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
パージェタ	ペルツズマブ	PER	初回840mg,2回目以降420mg	div	DAY1	2週	3週
トラスツズマブ	トラスツズマブ	HER	初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg	div	DAY1	2週	3週
ハラヴェン	エリブリン	ERB	1.4mg/m ²	div	DAY1、8	1週	3週

【DAY1】

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 250ml+ パージェタ mg / 初回:60分 2回目以降:30分
- ③ NS 250ml+ トラスツズマブ mg / 初回:90分 2回目以降:30分
(2回目以降 NS100ml)
- ④ NS 50ml / 5分
- ⑤ NS 50ml+ ハラヴェン mg / 5分
- ⑥ NS50ml / 5分

【DAY8】

- ① NS50ml / 5分
- ② NS 50ml+ ハラヴェン mg / 5分
- ③ NS50ml / 5分

【注意事項】

1.①初回ハーセプチン施行時カロナル錠併用(400mg以上が望ましい)

【休薬規定】

ERB:好中球数<1000 血小板数<7.5万 非血液毒性≥Grade3 AST・ALT≥ULN×5 T-Bli≥ULN×3

【減量規定】

ERB:前サイクルにて以下の副作用が見られた場合 1.4→1.1→0.7mg/m²→中止を考慮

好中球数<500 FN PLT<2.5万 輸血を要するPLT<5万 非血液毒性≥Grade3 副作用によりDay8を休薬した場合

【備考】

肝機能障害時：減量を考慮 腎機能障害時：減量不要

R3.2.28改訂