

癌化学療法輸液約束処方 乳27

癌種

乳癌

レジメン名

乳27 ATEZO + nabPTX

| 薬品名 (商品名) | 一般名 | 略号 | 標準投与量 | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 | 1クール期間 |
|-----------|-----------------|--------|-----------------------|------|-------------|------------|--------|
| テセントリク | アテゾリズマブ | ATEZO | 840 mg/body | div | 初回60分 以降30分 | DAY 1,15 | 28日間 |
| アブラキサン | アルブミン懸濁型パクリタキセル | nabPTX | 100 mg/m ² | div | 30分 | DAY 1,8,15 | |

[DAY 1,15]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 250ml + テセントリク 840 mg / 初回60分 2回目以降30分
☆フィルター使用

- ③ NS 50ml / 5分

Rp3終了後、側管から投与開始

- ④ NS 50ml + グラニセトロン 1A / 5分
- ⑤ NS 50ml + アブラキサン mg / 30分 ★フィルター不可
- ⑥ NS 50ml / 5分

[備考]

テセントリクはフィルター使用 Rp4からはフィルターなしで側管より投与開始

アブラキサンは、最終濃度:5mg/mlに調製すること。フィルターなし、他剤との配合は不可。

アルブミン製剤のため、製造番号を確認すること。投与時、患者の同意書が必要。

[休薬基準]

Day1:好中球数<1500 血小板数<10万 Day8,15:好中球数<500 血小板数<5万

AST・ALT>10×ULNまたはT-bli>1.5 Grade3以上の非血液毒性、全Grade肺事象

[減量基準]

1.5×ULN<T-bli≤5×ULNかつAST<10×ULN Grade3の下痢、口内炎 Grade3以上の吐気嘔吐、その他非血液毒性

[DAY 8]

- ① NS 50ml + グラニセトロン 1A / 5分
- ② NS 50ml + アブラキサン mg / 30分 ★フィルター不可
- ③ NS 50ml / 5分