

癌化学療法輸液約束処方 乳32

癌種 乳癌
登録No. 乳32 フェスゴ+DOC(HPD)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
フェスゴ	ペルツズマブ /トラスツズマブ		初回:IN	皮下	DAY1	2週	3週
			2コース目以降:MA				
ドセタキセル	ドセタキセル	DOC	75mg/m ²	div			

【初回】

- ① フェスゴ【IN】 / 8分かけて
- ② NS 100ml + デキサート 1V + グラニセトロン 1A / 30分
- ③ NS 250ml + ドセタキセル mg / 60分
- ④ NS 50ml / 5分

【2回目以降】

- ① フェスゴ【MA】 / 5分かけて
- ② NS 100ml + デキサート 1V + グラニセトロン 1A / 15分
- ③ NS 250ml + ドセタキセル mg / 60分
- ④ NS 50ml / 5分

【注意事項】

1. フェスゴ投与は大腿部。投与後は初回30分、2回目以降15分の観察時間を要す
2. 初回施行時カロナール錠併用(400mg以上が望ましい)(オプション)
3. 6週間以上の間隔が空いた場合、INから再開が望ましい
4. 術前・術後補助化学療法としては計4回まで

R5.12.4作成