

癌化学療法輸液約束処方 子頸7

癌種 進行・再発 子宮頸がん

レジメン名 子頸7

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
リブタヨ	セミプリマブ	CEMI	350 mg/body	div	30分	DAY 1	21日

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 15分
- ② NS 50ml + リブタヨ 350 mg / 30分（インラインフィルター使用）
- ③ NS 50ml / 5分

【注意事項】

- ・希釈後の最終濃度を1～20 mg/ml 以上とし、30分以上かけて点滴静注。
- ・投与の際にはインラインフィルター(0.2～5 μm)を使用すること。

＜休薬規定＞

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・AST,ALT ≥ Grade3 ・有害事象 ≥ Grade3 ・自己免疫疾患の発症 | <ul style="list-style-type: none"> ・間質性肺炎: G1→投与延期を検討、G2→投与延期、G3→投与中止 ・重症筋無力症、筋炎、: 投与中止 ・大腸炎、下痢: G2→投与延期(G1→再開)、≥G3→投与中止 ・肝機能障害: G2→投与延期(ベースラインまで改善→再開)、≥G3→投与中止 ・内分泌障害、副腎クリーゼ: 投与延期または中止 ・神経毒性: G2→投与延期(ベースラインに改善→再開)、≥G3→投与中止 ・皮膚毒性: ≥G3→投与延期(G1→再開) ・腎毒性: G2→投与延期(G1→再開)、≥G3→投与中止 ・1型糖尿病、脳炎、静脈血栓症: 専門医と連携し投与中止も検討 |
|---|---|

R6.4.13作成