

## 癌化学療法輸液約束処方 精1

癌種

精巣癌

レジメン名 精1

EP ( VP-16 + CDDP )

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
ベプシド	エトポシド	VP-16	100 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1-5	-	4週
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	20 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1-5	-	4週

### < EP療法前日 >

#### メイン

- ① ビカネイト 1000 ml + アスパラK 1A + 10%NaCl 1A + フロセミド 1A / 12hr
- ② = ① do
- ③ 生食 50 ml + メトクロプラミド 1A + ソルコーテフ 100 mg / 医師の指示書通り 別々のシリンジで  
1日3回まで 8時間以上おいて使用
- ④~⑫ = ③ do

### < EP療法 DAY 1-5 >

#### メイン

- ① ビカネイト 1000 ml + アスパラK 1A + 10%NaCl 1A + フロセミド 1A / 8hr
- ② = ① do
- ③ ヴィーンF 500 ml / 8hr

#### ロータリー

- 10:00-12:00 ① 生食 500 ml + ベプシド mg / 2hr
- 13:30 ② 生食 50 ml + ナゼア 1A / 全開
- 14:00-16:00 ③ 生食 250 ml + シスプラチン mg / 2hr
- 16:00-19:00 ④ 20%マンニトール 300 ml / 3hr
- 17:30 ⑤ 生食 50 ml + ナゼア 1A / 全開
- ⑤終了後すぐ ⑥ 生食 50 ml + ファモチジン 1A / 30分

**\*PVCフリーラインでフィルター通さないこと**

### < EP療法 DAY 6-7 >

#### メイン

- ① ビカネイト 1000 ml + アスパラK 1A + 10%NaCl 1A + フロセミド 1A / 8hr
- ② = ① do
- ③ ヴィーンF 500 ml / 8hr

H26.10.31改訂