

癌化学療法輸液約束処方 精胚2

癌種 精巣癌

レジメン名 精胚2 BEP (VP-16 + CDDP + BLM)

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
エトポシド	エトポシド	VP-16	100 mg/m ²	div	DAY 1-5	-	3週
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	20 mg/m ²	div	DAY 1-5	-	3週
ブレオ	ブレオマイシン	BLM	30mg/body	div	D2,9,16		3週

メイン< EP療法前日 >

- ① ビカネイト 1000 ml + KCL 10ml + 10%NaCl 1A + フロセミド 1A / 12hr
- ② = ① do

メイン<DAY 1-5>

- ① ビカネイト 1000 ml + KCL 10ml + 10%NaCl 1A + フロセミド 1A / 8hr
- ② = ① do
- ③ ヴィーンF 500 ml / 8hr

側管 <DAY 1,3,4,5>

- ① NS 50 ml + デキサート1A + グラニセトロン 1A / 5分
- ② NS 500 ml + エトポシド mg / 2hr
*PVCフリーライン使用、フィルター不可
*シスプラチン投与1.5時間前にイメンド服用
- ③ NS 250 ml + シスプラチン mg / 2hr
- ④ 20%マンニトール 300 ml / 3hr
- ⑤ NS 50 ml + グラニセトロン 1A / 5分
- ⑥ NS 50 ml + ファモチジン 1A / 30分

側管 <DAY 2>

- ① NS 50 ml + デキサート1A + グラニセトロン 1A / 5分
- ② NS 100 ml + ブレオ 30 mg / 30分
- ③ NS 500 ml + エトポシド mg / 2hr
*PVCフリーライン使用、フィルター不可
*シスプラチン投与1.5時間前にイメンド服用
- ④ NS 250 ml + シスプラチン mg / 2hr
- ⑤ 20%マンニトール 300 ml / 3hr
- ⑥ NS 50 ml + グラニセトロン 1A / 5分
- ⑦ NS 50 ml + ファモチジン 1A / 30分

<DAY 9,16>

- メイン ① ヴィーンF 500 ml / 8hr
側管 ② NS 100 ml + ブレオ 30 mg / 30分

【備考】 イメンド: DAY 1は125 mg DAY 2-5は80mgを服用。

2024.05.21 改訂
2021.09.06 改訂