

癌化学療法約束処方 卵巣1

癌種 卵巣癌
登録No. 卵1 PTX triw + CBDCA

| 薬品名(商品名) | 一般名 | 略号 | 標準投与量 | 投与経路 | 投薬期間 | 休薬期間 | 1クール期間 |
|----------|---------|-------|---------------------------|------|-------|------|--------|
| パクリタキセル | パクリタキセル | PTX | 175~180 mg/m ² | div | DAY 1 | 20日 | 21日 |
| カルボプラチン | カルボプラチン | CBDCA | AUC 5~6 | div | DAY 1 | 20日 | 21日 |

【DAY 1】

- ① NS 50 ml + デキサート 3V / 全開
- ② NS 50 ml + ファモチジン 20mg / 全開
- ③ NS 50 ml + アロキシ 1A / 30分
- ④ NS 500 ml + パクリタキセル mg / 3hr
投与速度: 投与開始後15分間 90ml/hr 以降 180ml/hr
- ⑤ 5%Tz 100 ml + ネオファーゲンC 20 ml + タチオン 200mg / 全開
- ⑥ NS 250 ml + カルボプラチン mg / 1hr
- ⑦ NS 50 ml + 8.4%メイロン 20 ml / 15分
- ⑧ NS 50 ml / 全開

【注意】 ・パクリタキセル投与30分前(Rp①)に レスタミン(10)5Tab 内服

・インラインフィルター(0.22 μm)を使用すること

【備考】 ・パクリタキセル滴下時、vital sign測定を頻回に

【パクリタキセル過敏症対策】

- ①投与速度 投与開始から15分は90ml/hr にて投与し、バイタル測定して問題なければ180ml/hrにアップする。
速度変更15分後に再度バイタル測定し、患者の状態に変化がなければ終了まで同速で投与を行う。
H27.6.15 女性診療科医局会にて決定