

癌化学療法約束処方 卵巣3

癌種 卵巣癌
 登録No. 卵3 PTX w3 + CBDCA w3

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	60~80mg/m ²	div	DAY1, 8, 15	1週	4週
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 2	div	DAY1, 8, 15	1週	4週

【DAY 1,8,15】

- ① NS 50ml+デキサート8mg / 5分
- ② NS 50ml+ファモチジン20mg / 5分
- ⑤ NS 50ml+アロキシ1A / 30分
- ④ NS 250ml+ パクリタキセル mg / 1hr
 投与速度: 投与開始後15分間 125ml/hr 以降 250ml/hr
- ⑥ NS 250ml+ カルボプラチン mg / 1hr
- ⑧ NS 50ml / 5分

TOTAL 3hr50min

【注意】 ・パクリタキセル投与30分前(Rp①)に レスタミン(10)5Tab 内服
 ・ インラインフィルター(0.22 μm)を使用すること

【備考】 ・ パクリタキセル滴下時、vital sign測定を頻回に

【パクリタキセル過敏症対策】

- ①投与速度 投与開始から15分は125ml/hr にて投与し、バイタル測定して問題なければ250ml/hrにアップする。
 速度変更15分後に再度バイタル測定し、患者の状態に変化がなければ終了まで同速で投与を行う。
 H27.6.15 女性診療科医局会にて決定

R1.9.6改訂