

癌化学療法約束処方 卵巣4

癌種 卵巣癌
登録No. 卵4 PTX triw

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	210 mg/m ²	div	DAY 1	3~4週	3~4週

【DAY 1】

- ① NS 50ml + デキサート 3V / 5分
- ② NS 50ml + ファモチジン20mg / 5分
- ③ NS 100ml + グラニセトロン1A / 30分
- ④ NS 500ml + パクリタキセル mg / 3hr
投与速度: 投与開始後15分間 90ml/hr 以降 180ml/hr
- ⑤ NS 50ml / 5分

TOTAL 4hr

【注意】 ・パクリタキセル投与30分前(Rp①)に レスタミン(10)5Tab 内服
・インラインフィルター(0.22 μm)を使用すること

【備考】 ・パクリタキセル滴下時、vital sign測定を頻回に

【パクリタキセル過敏症対策】

- ①投与速度 投与開始から15分は90ml/hr にて投与し、バイタル測定して問題なければ180ml/hrにアップする。
速度変更15分後に再度バイタル測定し、患者の状態に変化がなければ終了まで同速で投与を行う。
H27.6.15 女性診療科医局会にて決定

R1.9.6改訂