

癌化学療法約束処方 卵巣17

癌種 卵巣癌
 登録No. 卵17 DOC + CBDCA (PTXアレルギー用)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
ドセタキセル	ドセタキセル	DOC	60 mg/m ²	div	DAY 1	2週	3週
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5~6	div	DAY 1	2週	3週

【DAY1】

フィルター使用

- ① NS 50 ml + デキサート 8mg / 全開
- ② NS 50 ml + (グラニセトロン or オンダンセトロン or ナゼア or アロキシ) 1A / 全開
- ③ NS 250 ml + ドセタキセル _____ mg / 1hr
- ④ 5%Tz 100 ml + ネオファーゲンC 20 ml + タチオン 200mg / 30分
- ⑤ NS 250 ml + カルボプラチン _____ mg / 1hr
- ⑥ NS 50 ml + 8.4%メイロン 20 ml / 15分
- ⑦ NS 50 ml / 全開

【注意】・H2ブロッカーはCYP3A4阻害作用によりドセタキセルの皮膚毒性を増加させるため併用は避ける。

・①②の投与時間は主治医判断により変更可

R1.9.6改訂