## 癌化学療法約束処方 卵巢18

癌種 卵巣癌 登録No. 卵18 Liposomal DOX

_	<u> </u>							
	薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	1コースの期間
	ドキシル	ドキソルビシン塩酸 塩リポソーム注射剤	-	$50 \text{ mg/m}^2$	2 hr	末梢	DAY 1	28日

## **<DAY 1>** \*フィルターなし

- ① 5%TZ 50 ml + デキサート3V / 5分
- ② 5%TZ 50 ml + グラニセトロン 3mg / 5分
- ③ 5%TZ 50 ml / 5分
- ④ 5%TZ 500 ml + *ドキシル mg* / 2時間
- ⑤ 5%TZ 50 ml / 5分

Total 2hr

## く備考>

- ① ドキシルはリポソーム封入製剤のためフィルターを使用しない
- ② Infusion reaction発現時は点滴を一度止め医師へ連絡する。

Grade 1 → ドキシル投与速度を500ml/3hrに減速し再開

Grade 2 → 抗ヒスタミン剤、ステロイド剤、NSAIDs等の投与で回復すれば、 ドキシル投与速度を500ml/3hrへ減速し再開

Grade  $\geq 3 \rightarrow$ 中止

③ 悪心嘔吐、手足症候群、口内炎等へ支持療法薬を投与する(オプション)

<処方例> Rp 1. デカドロン(0.5) 4~8mg 分1~2 朝昼食後 3日間

Rp 2. プリンペラン(5) 3T 分3 毎食後 7日分

Rp 3. ナウゼリン(10) 3T 分3 毎食後 7日分

Rp 4. ヒルドイドソフト 2本 1日2回 手足

Rp 5. アズノールうがい液 2本 1日数回

H26.8.30改訂