

癌化学療法約束処方 卵巣22

癌種 卵巣癌
登録No. 卵22 GEM + CBDCA

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	1コースの期間
ゲムシタビン	塩酸ゲムシタビン	GEM	1000 mg/m ²	30 分	末梢	DAY 1, 8	21日
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 4	1 hr	末梢	DAY 1	

< DAY 1 >

- ① NS 50 ml + デキサート1V + アロキシ 0.75mg / 5分
- ② NS 100 ml + ゲムシタビン _____ mg / 30分
- ③ NS 250 ml + カルボプラチン _____ mg / 1hr
- ④ NS 50 ml / 5分

Total 1hr.40min

< DAY 8 >

- ① NS 50 ml + デキサート + グラニセトロン1A / 5分
- ② NS 100 ml + ゲムシタビン _____ mg / 30分
- ③ NS 50 ml / 5分

Total 40min

< 備考 >

- ① Grade 3/4の血液毒性および非血液毒性、酸素飽和度95%未満は休薬する。
- ② 休薬後、14日以上回復期間を要した場合は次回投与よりジェムザール800mg/m²に減量する。
- ③ 本治療法はプラチナ/タキサン系製剤の既治療例に対する2次治療のひとつである。
- ④ 副作用として血管炎、血管痛、間質性肺炎、骨髄抑制等に注意する。

H24.1.15 作成