

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： BRST-110

| 対象疾患 | レジメン名称 | コース期間 | 総コース数 | 適応 |
|------|------------------|-------|-------|--|
| 乳がん | weekly PTX100 | 7日間 | 12コース | <input type="checkbox"/> 進行/再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他 |

| 催吐 リスク |
|-----------|
| 軽度 |

| 根拠 |
|--|
| N Engl J Med 358: 1663-, 2008 J Clin Oncol 23: 3686-, 2005 J Clin Oncol 21: 588-, 2003 |

| | 薬品名 | 投与量 | 投与 経路 | 投与 時間 | Day | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ① | デキサート ファモチジン ポラミン 生理食塩液 | 6.6mg 20mg 5mg 50mL | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | |
| ② | パクリタキセル 生理食塩液 | 100mg/m ² 250mL | 点滴静注 | 60分 | ↓ | | | | | | | |
| ③ | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

<注意事項/備考>

- ✓ PTX：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ PTX：ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意
- ✓ 末梢神経障害（PTX）：四肢の知覚異常が主体、疼痛を伴うこともあり
- ✓ 術後/術前補助化学療法の場合：12コースが目安
- ✓
- ✓