

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： BRST-116

| 対象疾患 | レジメン名称 | コース期間 | 総コース数 | 適応 | 催吐リスク | 根拠 |
|------|---|---|-------|---|-------|---|
| 乳がん | Capecitabine 単剤 Capecitabine + Lapatinib | 【A法】28日間 【B法】21日間 【Cap+Lap】 21日間 | 規定なし | <input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他 | 軽度 | 【A法】 Breast Cancer 13: 49-, 2006 【B法】 J Clin Oncol 23: 792-2005 【Cap+Lap】 N Engl J Med 355: 2733-, 2006 |

| | 薬品名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|------|--------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 【A法（3週内服1週休薬）】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① | カベシタピン | 1650mg/m ² (825mg/m ² /回) | 内服 | 1日2回 朝夕食後 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 薬品名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | |
| 【B法（2週内服1週休薬）】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① | カベシタピン | 2500mg/m ² (1250mg/m ² /回) | 内服 | 1日2回 朝夕食後 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 薬品名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | |
| 【Capecitabine+Lapatinib（Cap：2週内服1週休薬、Lap：連日内服）】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① | カベシタピン | 2500mg/m ² (1250mg/m ² /回) | 内服 | 1日2回 朝夕食後 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | | | |
| ② | タイケルブ | 1250mg | 内服 | 1日1回 空腹時 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | |

<注意事項/備考>

- ✓ 他のフッ化ピリミジン系薬剤と併用禁忌（前後7日間以上の間隔を空ける）
- ✓ 【A法】投与量：BSA<1.31m²：1800mg/day、1.31≤BSA<1.64m²：2400mg/day、1.64≤BSA：3000mg/day
- ✓ 【B法】投与量：BSA<1.33m²：3000mg/day、1.33≤BSA≤1.57m²：3600mg/day、1.57≤BSA≤1.81m²：4200mg/day、BSA>1.81m²：4800mg/day
- ✓ 【Cape+Lap】投与量：BSA<1.36m²：2400mg/day、1.36≤BSA<1.66m²：3000mg/day、1.66≤BSA<1.96m²：3600mg/day、BSA≥1.96m²：4200mg/day
- ✓ 【Cape+Lap】Lap：空腹時内服（食事の1時間以上前または食後1時間以降）、Cape：食後30分以内に内服