

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： BRST-120

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
乳がん	GT療法	21日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	J Clin Oncol 26: 3950-7, 2008

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート ファモチジン ポラミン 生理食塩液	19.8mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分	↓																				
②	アロキシ 生理食塩液	0.75mg 50mL	点滴静注	30分	↓																				
③	パクリタキセル 生理食塩液	175mg/m ² 500mL	点滴静注	180分	↓																				
④	ゲムシタピン 生理食塩液	1250mg/m ² 100mL	点滴静注	30分	↓																				
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
①	デキサート 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴静注	5分																					
②	ゲムシタピン 生理食塩液	1250mg/m ² 100mL	点滴静注	30分																					
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分																					

<注意事項/備考>

- ✓ PTX：0.2または0.22 μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ PTX：ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意
- ✓ 末梢神経障害（PTX）：四肢の知覚異常が主体、疼痛を伴うこともあり
- ✓ GEM：血管痛、皮疹に注意
- ✓ GEM：30分かけて投与（60分以上かけて投与すると副作用増強の可能性）、溶解液を冷蔵庫で保管すると結晶が現れることあり
- ✓