【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： BRST-123

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応
乳がん	Bv + wPTX	28日間	規定なし	■ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他

催吐リスク	根拠
軽度	N Engl J Med 357: 2666-76, 2007 Breast Cancer Res Treat 129: 829-38, 2011

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	デキサート ファモチジン ポララミン 生理食塩液	6.6mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分	↓							↓							↓													
②	パクリタキセル 生理食塩液	80mg/㎡ 250mL	点滴静注	60分	↓							↓							↓													
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓							↓							↓													
④	アバスチン 生理食塩液	10mg/kg 100mL	点滴静注	初回 90分 2回目 60分 3回目～ 30分	↓														↓													
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓														↓													

＜注意事項/備考＞

- ✓ 【ポイント】PTX単剤と比較した際のOSの改善は示されていない（PFSの延長のみ）
- ✓ PTX：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ PTX：ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意
- ✓ 末梢神経障害（PTX）：四肢の知覚異常が主体、疼痛を伴うこともあり
- ✓ Bv：出血、創傷治癒遅延あり、原則として術後4週間は投与せず / 血圧上昇（高血圧）に注意（自宅での定期的な測定・記録を）
- ✓ Bv：初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与