

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： BRST-133

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
乳がん	dose-dense PTX療法	14日間	4コース	<input type="checkbox"/> 進行/再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	J Clin Oncol 21: 1431-9, 2003

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
①	デキサート ファモチジン ポラミン 生理食塩液	19.9mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分	↓													
②	パクリタキセル 生理食塩液	175mg/m ² 500mL	点滴静注	180分	↓													
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓													
④	ジーラスタ	3.6mg	皮下注				↓											

＜注意事項/備考＞

- ✓ PTX：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ PTX：ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意
- ✓ 末梢神経障害（PTX）：四肢の知覚異常が主体、疼痛を伴うこともあり
- ✓ 点滴終了24時間経過後に、ジーラスタを投与（day2-3が目安）
- ✓
- ✓