

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号：CRC-111

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐 リスク	根拠
大腸がん	S-1 単剤	42日間	【進行/再発】 規定なし 【術後補助】 6か月	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	Br J Cancer 95: 1637-, 2006 Br J Cancer 83: 141-, 2000

	薬品名	投与量	投与 経路	投与 時間	Day										
					1	2	3	~	26	27	28	29	~	42	
①	ティーエスワン	80mg/m <sup>2</sup> /日	内服	1日2回に分けて 朝夕食後	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓		↓↓	↓↓	↓↓			

＜注意事項/備考＞

- ✓ S-1投与量：BSA<1.25m<sup>2</sup>：80mg/day、1.25≤BSA≤1.5m<sup>2</sup>：100mg/day、BSA>1.5m<sup>2</sup>：120mg/day
- ✓ 他のフッ化ピリミジン系薬剤と併用禁忌（前後7日間以上の間隔を空ける）
- ✓ S-1：空腹時の内服は避ける（抗腫瘍効果減弱の可能性）
- ✓
- ✓
- ✓