

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号：CRC-135

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
大腸がん	Bv + S-1	42日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	Eur J Cancer 51: 935-41, 2015

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day						
					1	~	15	~	29	~	42
①	アバスチン 生理食塩液	5mg/kg 100mL	点滴静注	初回 90分 2回目 60分 3回目~ 30分	↓	—	↓	—	↓	—	—
②	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓	—	↓	—	↓	—	—
③	ティーエスワン (28日内服14日休薬)	80mg/m ² /日	内服	1日2回に分けて 朝夕食後	↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓		

＜注意事項/備考＞

- ✓ S-1投与量：BSA<1.25m²：80mg/day、1.25≤BSA≤1.5m²：100mg/day、BSA>1.5m²：120mg/day
- ✓ S-1：他のフッ化ピリミジン系薬剤と併用禁忌（前後7日間以上の間隔を空ける） / 空腹時の内服は避ける（抗腫瘍効果減弱の可能性）
- ✓ S-1の内服タイミング：Day1の夕食後からDay29の朝食後まで（28日間内服14日間休薬）
- ✓ Bv：出血、創傷治癒遅延あり、原則として術後4週間は投与せず / 血圧上昇（高血圧）に注意（自宅での定期的な測定・記録を）
- ✓ Bv：初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与
- ✓