

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： GAST-127

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
胃がん	adj CapeOX (XELOX)	21日間	8コース (原則、半年間)	<input type="checkbox"/> 進行/再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	中	Lancet 379: 315-21, 2012 Lancet Oncol 15: 1389-96, 2014

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート アロキシ 生理食塩液	6.6mg 0.75mg 50mL	点滴静注	15分	↓																				
②	エルプラット 5%ブドウ糖液	130mg/m ² 250mL	点滴静注	120分	↓																				
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
④	カペシタピン	2000mg/m ² /日	内服	1日2回に分けて 朝夕食後	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			

<注意事項/備考>

- ✓ Cape投与量：BSA<1.36m²：2400mg/day、1.36≤BSA<1.66m²：3000mg/day、1.66≤BSA<1.96m²：3600mg/day、BSA≥1.96m²：4200mg/day
- ✓ Capeの内服タイミング：Day1の夕食後からDay15の朝食後まで（ただし、Day2の朝からの内服でも可）、食後30分以内に内服
- ✓ Cape：他のフッ化ピリミジン系薬剤と併用禁忌（前後7日間以上の間隔を空ける）
- ✓ HFS（Cape）：保湿剤で予防を。痛み、腫脹、水膨れなどの症状に注意
- ✓ 腎障害（Cape）：重篤な腎障害（CCr<30mL/min）では投与禁忌。Ccr 30-50mL/minでは減量を（75%用量など）
- ✓ 過敏症（L-OHP）：7-8コース前後で頻度上昇、症状は呼吸苦、かゆみ、発赤など
- ✓ 末梢神経障害（L-OHP）：急性（寒冷刺激で誘発）と慢性（知覚異常を伴う機能障害、総投与量850mg/m²より頻度上昇）