

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： TCC-121

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応
尿路上皮がん	adjuvant Nivolumab 単剤	14日間 or 28日間	規定なし	<input type="checkbox"/> 進行/再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他

催吐リスク
最小度

根拠
N Engl J Med 384: 2102-14, 2021

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day														
					1	2	~	14	15										
【2週間隔で投与する場合】																			
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓														
②	オプジーボ 生理食塩液	240mg/body 50mL	点滴静注	30分	↓												↓		
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓												↓		
【4週間隔で投与する場合】																			
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓													↓	
②	オプジーボ 生理食塩液	480mg/body 100mL	点滴静注	30分	↓													↓	
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓													↓	

<注意事項/備考>

- ✓ Nivolumab：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与
- ✓ 間質性肺炎：初期症状は息切れ、発熱、咳嗽（空咳）など。胸部X線検査やSPO2モニタリング等で定期的にモニタリングを
- ✓ 血糖上昇：口渇、多飲、多尿、倦怠感などの症状に注意。来院時には血糖の測定を
- ✓ 大腸炎、下痢：持続する腹痛、嘔吐、下痢、血便など
- ✓ 甲状腺機能障害：投与中は定期的にTSH、FT3、FT4などの検査を
- ✓