

## 癌化学療法輸液約束処方 胃11

### 外来通院用

癌種 胃癌 1.術後補助療法 2.再発、切除不能(特に骨転移 DIC)

レジメン名 胃11 MTX + 5FU 中等量

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬時間	投与日	1コースの期間
メソトレキサート	メソトレキサート	MTX	80~100 mg/m <sup>2</sup>	iv	静脈内注射	DAY 1, 8, 15	28日間
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	500~600 mg/m <sup>2</sup>	div	60分	DAY 1, 8, 15	
ロイコボリン	ロイコボリンカルシウム	LV	45mg/day	po	-	DAY 2 (10時, 16時, 22時)	

### DAY 1, 8, 15

div

- ① NS 50ml + デキサート 1V / 15分
- ② NS 50ml + グラニセトロン 1A / 15分
- ③ ソルデム1 500ml + 7%メイロン 20ml 2A / 120分
- ④ ソルデム1 500ml / 120分

(側管)

- A. NS 10ml + ダイアモックス 250mg / iv 上記①
- B. 5%TZ 20ml + メソトレキサート \_\_\_\_\_ mg / iv (医師施行) 上記③
- C. NS 100ml + フルオロウラシル \_\_\_\_\_ mg / 60分 上記④
- D. NS 50ml / 5分 (Cの直後)

Total 270分

- Rp) 1. ダイアモックス(250)1Tab/1× D1T (当日15~16時)
2. ロイコボリン(5)9Tab/3× D1T (翌日の10時 16時 22時)
3. ナゼアOD(0.1)1Tab/1× D2T (翌日朝、翌々日朝)

H21.7.1 改訂